=對シテしまむらさきハ用ヒズこうとうむらさきヲ用フル方ガョイノハ既ニ正宗嚴敬氏ノ 最新臺灣植物總目錄及ビ金平亮三博士ノ臺灣樹木誌デ實行セラレテキル通リデアル。 總覽 ガ C. subpubescens ト C. boninensis ヲ兩立サセテキルノハヨクナイ。

小笠原島デハ Callicarpa subpubescens ヲはしき即チ箸ニスル木ト言フ。服部博士ニョルトままっきト言フ由、標本ノラベルノ上ニ書イテアルが、小笠原島デハままき又ハままっきハうらじろえのき、Trema argentea ヲ意味スル。

以上述べタ點ダケデハ、MAXIMOWICZ が第 1 ト第 2 /種ヲ混同シテヰタノカ、又ハ單=取リ違へテヰタノカ、又兩種ヲ一緒=シタ力ガョイト言フ考へカラヤツタ事カドウカハ判斷デキナイ。シカシ、小生ノ小笠原島デノ觀察=ヨレバ第 1 ト第 2 ノ種ハ疑問點ノ第 3 ノ所デ觸レタ事實ガアル=關ハラズ、相當隔リガアルト思フ。カヘツテ一見甚ダ遠イト思ハレル第 1 ト第 3 ノ種トハ、第 1 ノ種ガ非常=變化スル性質ヲ有スルタメニ、ソノ極端形ヲ中間=置イテ稍近ダイテ來ル事が判ツタ。何レニシテモ、コノ 3 種ハヤハリ種類トシテノ差ヲ有スル專ヲ認メル。詳細ハイヅレ發表スル心算デアル。ココニ掲載シタ寫眞ハ寄贈サレタ他ノ 2 葉ノ寫眞ト共=東大理學部植物學教室ノ標本室=藏メタ。

〇きつねのぼたんノ紫葉品(津山 荷)

去年ノ春、中井猛之進先生ハ大隅地方ノ採集旅行ヲサレテ、莫大ナ御收獲ガアツタガ、ソ ノ中ニ、田代村デ採集サレタきつねのぼたんノー品種ガアツタ。コレヲ小石川植物園ニ持参 サレテ、栽培セシメラレタ所、今春花ガ吹イタ。 コレニ就イテ記載スル様ニト言ハレタノ デ、新タニ**むらさきさつねのぼたん**ト命名シテ頂イテ、下ノ相記文ヲ添エテ發表スル。

コノモノハ早春花ノ開カナイ中ニハ、葉莖ニ一個所モ緑色ヲ呈スル所ガナク、丁度むら さきみつば Cryptotaenia japonica HASSKARL var. atropurpurea MAKINO ノ様ナ紅紫 褐色ヲ呈スル。 花が咲ク頃ニナルト葉ノ表面ハ葉脈ノミガ紅褐色ヲ呈シ、下面ハ全體ガ紫 褐色ヲナシ莖ハ綠色デアルガ紫褐色ノ細點ヲ有シ、蕚片ノ背面ニモ褐色ノ汚レヲ生ズル。

Ranunculus japonicus Thunberg in Trans. Linn. Soc. II, p. 337 (1794). forma coloratus Tuyama forma nova.

Foliis petiolisque in omnibus partibus in tempore verno fusco-rubescentibus,* sub tempore florendi foliis radicalibus supra ad nervos margineque atro-fusco-rubescentibus in sinu laminarum rubro-purpureis subtus toto pallide fusco-rubescentibus, petiolis atro-fusco-rubescentibus patente hirsutis, foliis caulinis cum petiolis caulem amplectentibus intense rubro-castaneis ornatis, caule plus minus intensius castaneo-punctato, floribus cum sepalis aureis dorso saltem partim castaneis.

Nom. Jap. Murasaki-kinpôge (nov. Nakai, ex ore-ipsius).

Hab. Japonia, Kyûsyû: Prov. Oosumi, Kimotuki-gun, in oppido Taziro (leg. Prof. T. Nakai, Apr. 1939—typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo.).

^{*} RIDGWAY: Color Standards and Nomenclature: Dahlia Purple—Pansy Purple—Violet Carmine.